

Covid-19-Impfung

Triage-Fragebogen zur Covid-19 Impfung in der Apotheke

Stand: 09 August 2021

Die nachfolgenden Fragen helfen bei der Entscheidung, ob die Covid-19-Impfung in der Apotheke durchgeführt werden kann, ob sie verschoben werden muss oder ob ein Arztbesuch angezeigt ist.

1. Ausschlusskriterien

Wird eine oder mehrere der Fragen Nr. 1 bis 5 mit **JA** beantwortet, kann die Covid-19-Impfung **in der Apotheke nicht durchgeführt werden**.

| Treffen diese Kriterien auf Sie zu? | JA | NEIN |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Sie sind jünger als 16 Jahre (gilt für COVID-19 Vaccine von Moderna®) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Sie sind schwanger oder es besteht die Möglichkeit, dass Sie schwanger sein könnten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. Sie leiden unter einer Immunschwäche oder Sie nehmen Medikamente ein, die das Immunsystem beeinflussen (z.B. Kortison, Chemotherapie oder immunsuppressive Therapie) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. Sie haben eine Allergie gegen Bestandteile ¹ des Impfstoffs (z.B. Polyethylenglycol PEG, Trometamol) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 5. Sie hatten früher einmal schwere Reaktionen oder Allergien auf einen Impfstoff | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Wird eine oder mehrere der Fragen Nr. 6 bis 9 mit **JA** beantwortet, muss die Covid-19-Impfung **verschoben werden**.

| Treffen diese Kriterien auf Sie zu? | JA | NEIN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 6. Sie leiden zurzeit an einer akuten fieberhaften Erkrankung / Erkältung (Covid-Test empfohlen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Sie befinden sich aktuell in angeordneter Quarantäne | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Sie haben in den letzten 7 Tagen eine andere Impfung erhalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

| Besonderes Impfrisiko (Impfung möglich mit den nötigen Vorsichtsmassnahmen) | JA | NEIN |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 9. Leiden Sie an einem Gerinnungsleiden (z.B. Mangel an Gerinnungsfaktoren, Bluterkrankheit)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. Nehmen Sie regelmässig Medikamente zur Gerinnungshemmung (Blutverdünner) ein? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Leiden Sie unter chronischen Krankheiten oder nehmen Sie regelmässig Medikamente ein? Falls ja, welche? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

2. Angaben zur Person

| | |
|---|-------------------------------------|
| Nachname : | Vorname : |
| Geburtsdatum : | |
| Geschlecht: <input type="checkbox"/> Männlich <input type="checkbox"/> Weiblich <input type="checkbox"/> Andere | Strasse : |
| PLZ / Ort : | Telefonnummer (Mobil) : |
| Krankenkasse: | Versicherungskartennr.: 80756 |

¹ Inhaltsstoffe des COVID-19 Vaccine Moderna® mit Allergierisiko: Polyethylenglycol (PEG2000 DMG), Trometamol, Trometamol HCl



3. Mögliche unerwünschten Wirkungen und weitere Informationen

- Lokale Reaktionen: Schmerzen, Schwellung, Rötung oder Ausschlag, an der Injektionsstelle, «COVID-Arm», der hauptsächlich ca. 1 Woche nach der ersten Injektion mit dem COVID-19-Impfstoff von Moderna® auftreten kann.
- Systemische Reaktionen: Müdigkeit, Kopfweg, Muskel- und Gelenkschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, Übelkeit, Erbrechen
- Sehr seltene Nebenwirkung Myokarditis: Im Falle von Brustschmerzen, Kurzatmigkeit oder Herzklopfen innerhalb von 14 Tagen nach der Impfung, ist sofort medizinische Beratung und Hilfe einzuholen².
- Schwere unerwünschte Impferscheinungen sind sehr selten (z.B. temporäre Gesichtslähmungen, Schock, Anaphylaxie)
- Für einen ausreichenden Schutz sind zwei Impfdosen in einem Abstand von ca. 4 Wochen nötig. Für Personen mit einer bestätigten³ Covid-19-Infektion ist 1 Dosis Impfstoff ausreichend, welche zwischen 1 und 6 Monaten nach der Infektion⁴ empfohlen ist (Ausnahme: Besonders gefährdete Personen (BGP) benötigen nach einer bestätigten Infektion 1 Dosis zwischen 1 und 3 Monaten nach Infektion. BGP mit Immunschwäche wenden sich für weitere Informationen an ihre/n Apotheker/in oder ihre/n Arzt/Ärztin).
- Die vom BAG empfohlenen Schutzmassnahmen (Abstand, Maske, Hygiene, etc.) gelten auch mit der Impfung. Ausnahme: bei privaten Treffen von vollständig geimpften Personen (14 Tage nach 2. Injektion) → auf Maske und Abstand kann verzichtet werden.
- Um allfällige seltene allergische Reaktionen abzuwarten, bleiben Sie **nach der ersten Impfung für 15 Minuten** und bei der **zweiten Impfung für 5 Minuten** im Wartebereich der Apotheke zur Beobachtung. Bei späteren Reaktionen oder Symptomen kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihre/n Apotheker/in oder Ihre/n Arzt/Ärztin.
- Die Covid-19 Impfung ist für Personen kostenlos, die über eine obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) in der Schweiz verfügen. Gleichfalls für Personen ohne OKP mit Wohnsitz oder ständigem Aufenthalt in der Schweiz (z. B. Diplomaten, Studenten, Rentner, sans-papiers) und für Grenzgänger, wenn sie aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit einem Infektionsrisiko ausgesetzt sind (z. B. Gesundheitspersonal im Kontakt mit besonders gefährdeten Personen oder Pflegepersonal in Heimen / Institutionen).

4. Aufklärung und Einwilligung

Ich habe obige Informationen über die Impfung zur Kenntnis genommen und verstanden. Allfällige Fragen konnte ich vorgängig mit einer Fachperson klären. Ich habe keine weiteren Fragen. Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich mit der Durchführung von zwei Injektionen, mit der elektronischen Erfassung meiner Daten sowie deren Weiterleitung an die zuständige Behörde durch die Apotheke, einverstanden.

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass sämtliche im Fragebogen angegebenen Daten richtig und vollständig sind.

Ort/Datum: Unterschrift:

² Die sehr seltene Nebenwirkung Myokarditis tritt primär innerhalb von 14 Tagen nach der zweiten Dosis auf und zwar häufiger bei jüngeren Männern.

³ Bestätigt heisst: Positiver PCR- oder Antigentest (kein Selbsttest) oder Nachweis von IgG Antikörpern gegen SARS-CoV-2.

⁴ Minimalintervall für eine einzelne Impfdosis: 4 Wochen nach Infektion.